

残草対策について

管内の圃場を巡回しておりますと、初中期一発剤や中期剤等でとりこぼした雑草が見える圃場が例年以上に散見されます。圃場によっては、稲が雑草により養分が吸われているような圃場も見られます。残草がひどい圃場については、今後の生育にも影響が出てきますし、特に**ノビエ・ホタルイ**の発生量が多いと**斑点米カメムシ類の増殖源**にもなりますので、早めの対応をお願いいたします。

稲の生育も早いですが、雑草の生育も早くなっておりますので、高葉令の雑草にも効果のある剤を選んで下さい。

ノビエ対策除草剤	使用量及び使用方法	使用時期
クリンチャー1 ^キ 粒剤	1kg/10a 湛水散布	ノビエ4.0葉期まで
	1.5kg/10a 湛水散布	ノビエ5.0葉期まで
ヒエクツパエース1 ^キ 粒剤	1kg/10a 湛水散布	ノビエ5.0葉期まで
クリンチャーEW	100ml/10a 10a当たり薬液100mlを 水25ℓ～100ℓに希釈して散布 展着剤加用	ノビエ6.0葉期まで

ノビエ以外の対策除草剤	使用量及び使用方法	使用時期
バサグラン粒剤	3kg/10a 落水散布 (土が湿っている状態)	散布後7日間くらいは入水は行わない。 収穫60日前まで使用
バサグラン液剤	500～700ml/10a 10a当たり薬液500～700mlを 水70ℓ～100ℓに希釈して散布	散布後7日間くらいは入水は行わない。 収穫50日前まで使用

ノビエと広葉雑草対策除草剤	使用量及び使用方法	使用時期
クリンチャーバスME液剤	1000ml/10a 10a当たり薬液1000mlを 水70ℓ～100ℓに希釈して散布	ノビエ5葉期 収穫50日前まで使用
ワイドパワー粒剤	3kg/10a 落水散布 (土が湿っている状態)	ノビエ5葉期 収穫60日前まで使用

※ 各営農センターの営農担当が上記の除草剤を、車に配置して巡回しておりますので、営農担当に相談の上、すみやかな対応をお願いいたします。